Памятка

«Осторожно, Африканская чума свиней!»

За 2021год во Владимирской области зарегистрированы 8 очагов африканской чумы свиней: 2 – в фермерских хозяйствах Камешковского района, 6 – в личных подворьях Камешковского, Петушинского, Селивановского и Муромского районов, а также во Владимире. Во всех случаях на территории, где выявлена инфекция вводился карантин.

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 06.09.2021г №137 территория Кольчугинского района объявлена зоной наблюдения за АЧС, где запрещается:

- ввоз свиней для воспроизводства;

- ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных против рожи и классической чумы свиней, не ранее 30 дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;

- реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;

- проведение сельскохозяйственных ярморок, выставок, торгов других мероприятий, связанных с предвижением, перемещением и скоплением свиней;

- выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими животными;

 убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке;

 вывоз свиней;

 вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления и продукции непромышленного изготовления, переработанной и обеззараженной в соответствии с Правилами;

 охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.

Африканская чума свиней - острое вирусное заболевание. К нему восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Заражение происходит при контакте здоровых свиней с больными, а также вирусоносителями. Инфекция распространяется через корм, пастбища, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Заболевание может протекать молниеносно, остро или хронически. В первом случае животные гибнут внезапно, без характерных признаков; во втором у них повышается температура тела до 42,5˚С, развивается одышка, кашель, пропадает аппетит, наступает рвота, возникают параличи, наблюдается понос с кровью, посинение кожи на ушах и пятачке, животное резко слабеет.

Опасность распространения вируса АЧС усугубляется высокой его устойчивостью к различным физическим и химическим факторам – вирус выдерживает низкие температуры, относительно устойчив к высоким температурам и длительное время активен в объектах внешней среды.

Лечение и вакцинация африканской чумы не разработаны.

Владельцам свиней при подозрении на данное заболевание необходимо обратиться в ветеринарную службу по тел.: 2-29-50, 4-93-68.

ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ»